

# Záznamová karta pacienta užívajícího warfarin sodný

30 kusů

**ROCHE s.r.o.**, Diagnostics Division  
Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2  
tel.: 220 382 500  
[www.coaguchek.cz](http://www.coaguchek.cz)

**Orion Oyj**, organizační složka  
Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4  
tel.: 227 027 263  
[www.warfarin.cz](http://www.warfarin.cz)

## Zkrácená informace o léku

**Složení:** Warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg v 1 tabletě.

**Indikace:** profylaxe a léčba tromboembolických stavů, riziko embolizace při fibrilaci síní, akutní IM, riziko embolizace po implantaci chlopně náhrady, recidivující povrchní tromboflebitida.

**Kontraindikace:** přecitlivělost na složky přípravku, těhotenství, krvácivé stavy, těžké poškození jaterních nebo ledvinových funkcí, neléčená nebo nekontrovaná těžká hypertenze, nedávné nitrolební krvácení, predispozice k nitrolebnímu krvácení, operace CNS nebo očí, predispozice ke krvácení gastrointestinálního traktu nebo močových cest, infekční endokarditida nebo krvácení do osrdečníku, demence, psychózy, alkoholismus.

**Balení:** 100 tablet.

**Dávkování a způsob podání:** dávkování individuální podle protrombinového času. V prvních 2-4 dnech se podává vyšší dávka (nejčastěji 8 -10 mg warfarinu), která se zpravidla snižuje podle dosažených hodnot INR. Optimální hodnoty INR se pohybují podle závažnosti v rozmezí 2,0-3,5. Ukončení léčby musí být pozvolné pro možné riziko trombotických komplikací.

**Držitel registračního rozhodnutí:**  
Orion Corporation, P.O. Box 65, 02101 Espoo, Finsko.

**Časté a závažné lékové interakce:**

**Účinek warfarinu zvyšují:** salicyláty, cotrimoxazol, metronidazol, erythromycin a některé další makrolidy, doxycyklin, některé sulfonamidy, flukonazol, itraconazol, mikonazol, další imidazolová antimykotika, amiodaron, propafenon, chinidin, sotalol, sulfipyrazon, disulfiram, fenylbutazon, ostatní tetracykliny, chloramfenikol, nidrazid, chinolony, cefotetan, cefamandol, latamoxef, cefoperazon, vysoké dávky PNC, piroxikam, allopurinol, benzbromaron, anabolika, danazol, tamoxifen, statiny, fibráty, 5-fluorouracil, tyroxin.

**Účinek warfarinu zeslabují:** vitamin K, koenzym Q10 (ubidecarenone) barbituráty, rifampicin, rifabutin, karbamazepin, nafcilin, didoxacilin, griseofulvin, cholestyramin, chlordiazepoxid, glutethimid, metformin, diuretika, colestipol, rioprostil, vitamin E, antacida, sucralfat. Účinek warfarinu se snižuje požíváním velkého množství potravin bohatých na vitamin K.

**Při předávkování:** podat vit. K perorálně nebo parenterálně, čerstvou krev, mraž. plasmu, koagulační faktory.

**Nežádoucí účinky:** krvácivé stavy, nevolnost, zvracení a průjem. K dispozici v lékárnách na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

**Registrační číslo:** 16/011/89-S/C.  
**Datum poslední revize textu:** 1.12.2002

# WARFARIN ORION

warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg v 100 tabletovém balení

**ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA  
S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM  
MONITORINGEM INR**



Roche

[www.coaguchek.cz](http://www.coaguchek.cz)

ORION  
PHARMA

[www.warfarin.cz](http://www.warfarin.cz)



